

HERBICIDA

PEDIMET 33 EC

PENDIMETALINA

CONTROL PRE-EMERGENCIA



HERBICIDA


- Actividad residual para especies anuales de hoja ancha
- Se absorbe por raíces y hojas
- Mayor efecto en suelos húmedos y bien preparados

SÍNTOMAS EN LA MALEZA

Las plantas afectadas mueren después de la germinación o durante la emergencia.

BENEFICIOS

- Alta selectividad a los cultivos de maíz, arroz, tabaco, frijol, cebolla, para un control eficaz de un amplio rango de malezas.
- Eficaz en tipos de suelo arenosos y arcillosos.
- El producto se descompone durante el ciclo del cultivo, no afectando a otros cultivos en rotación.



DOSIS RECOMENDADA

MONOCOTILEDONAS 3-4 L/ha	
Amaranthus blitum	Bledo
Amaranthus retroflexus	Bledo, moco de pavo
Chenopodium album	Cenizo
Euphorbia spp	Lechetezina
Medicago spp	Amelga
Portulaca oleracea	Verdolaga
Rapnanus raphanistrum	Mostaza, rabaniza
Sonchus oleraceus	Cardinchera, lechacinios
Urtica urens	Ortiga
Galium oparine	Amor del Hortelano, lapa
Solanum nigrum	Tomatitos, hierba mora
Sinapis arvensis	Jaramago
Polygonum aviculare	Ciennudos
Polygonum convolvulus	Polígono trepador
Polygonum lapathifolium	Polígono
Polygonum persicaria	Polígono
Fumaria officinalis	Conejitos, sangre de Cristo
Spergula arvensis	Esparrilla
Veronica hederaefolia	Té de Europa, borroncillo
Silene inflata	Collejas
Anagallis arvensis	Murajes
Lamium amplexicaule	Ortiga muerta
Lamium purpureum	Ortiga muerta
Brassica spp	Mostaza negra
Capsella bursa-pastoris	Bolsa de pastor
Papaver rhoeas	Amapola, ababol
Diploxys muralis	Jaramago
Diploxys erucoides	Jaramago blanco
Atriplex patula	Armuelle
Xanthium spp	Bardana, picos

DICOTILEDONAS 3-4 L/ha	
Anacyclus clavatus	Pajillos, magarza
Cerastium glomeratus	Oreja de ratón
Chrozophora tinctoria	Tornasol
Heliotropium europaeum	Verruguera
Mercurialis annua	Mercurial
Myosotis arvensis	Nomeolvides
Oxalis corniculata	Trévol
Rapistrum rugosum	Tamarillas
Sida filiformis	Sida
Sisymbrium officinale	Jaramago
Sisymbrium irio	Jaramago
Specularia speculum-veneris	Peine de Venus
Viola spp	Viola
Setaria spp	Amor de Hortelano
Digitaria spp	Pata de gallina
Echinochloa spp	Pata de gallo
Alopecurus myosuroides	Cola de zorra
Apera spica-venti	-
Dactyloctenium aegyptium	-
Eleusine indica	-
Eragrostis spp	-
Phalaris minor (incorporado)	Alpiste
Lolium spp (incorporado)	Vallico,
Poa spp	Pelosa, espiguilla

*Volumen de aplicación 400 L de agua
60 L aplicación aérea

MOMENTO DE APLICACIÓN

Programar la aplicación si hay previsión de lluvia en las siguientes 24 horas.

Aplicar en pre-emergencia de las malas hierbas Cuando se aplica en pre-siembra o pre-transplante debe incorporarse mediante una labor ligera con un riego.

MODO DE ACCIÓN

Herbicida pre-emergencia

Inhibe la división celular durante la mitosis, tanto en los meristemos apicales como radiculares. Esta interrupción anula la polimerización proteínica que da lugar a la formación de los micro-túbulos que posibilitan la división celular



PEDIMET 33 EC N° Reg. 6745 de 30 de Abril de 2014
HERBICIDA
PENDIMETALINA

PRESENTACIÓN

Bidoncito de 5 L
Bidón de 20 L
Tambor de 200 L

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.