


**HERBICIDA**

# CLINUX 20 EC

## CIHALOFOP BUTIL

### CONTROL: POST-EMERGENTE



**EFECTO HERBICIDA**, específico y selectivo de acción sistémica.

Específico contra las especies de género *echinochloa*.

Efectivo contra biotipos de *echinochloa* resistentes a herbicidas de uso común.

Selectivo al ser metabolizado en arroz a moléculas inactivas y en *echinochloa* se metaboliza a sustancias herbicidas.

## DOSIS

| CULTIVO               | PLAGAS A CONTROLAR   | DOSIS RECOMENDADA | EPOCA Y FRECUENCIA  |
|-----------------------|--|-------------------|---|
| Arroz<br>Oryza Sativa | Echinochloa colonum (Arrocillo)<br>Echinochloa cruss-galli (Capin / Pata de gallo)<br>Echinochloa oryzicola (Cola de caballo)<br>Leptochloa filiformis (Cola de zorra)<br>Paspalum pilosum (Paja peluda)<br>Eleusine Indica (Pata de gallina)<br>Digitaria sanguinalis (Guarda rocío)<br>Rottboellia cochinchinensis (Caminadora)<br>Ischaemum rugosom (Mazorquilla) | 1-1.2<br>L/ ha    | El producto debe ser aplicado sobre malezas emergidas en activo crecimiento |

\*Volumen de aplicación 400 L de agua/ha

## FORMA DE APLICACIÓN

Debe aplicarse cuando el arroz se encuentra entre el estadio de 1-4 hojas y pleno ahijamiento y Echinochloa cruss-galli en estadio de 1-3 hojas o la Echinochloa con no más de 20 cm.

Antes de aplicar debe bajarse el nivel del agua, de forma que toda la Echinochloa quede fuera y mantener el nivel de agua de 24 -48 horas después de la aplicación.

## MODO DE ACCIÓN

Herbicida post-emergente que es absorbido rápidamente por los tejidos de las malezas. Con movilidad por el floema y xilema, paraliza el crecimiento de raíces y partes aéreas en pocas horas. Lo síntomas son visibles a la semana y la maleza muere en 14-18 días.

## MOMENTO DE APLICACIÓN

|   |               |
|---|---------------|
| Momento de aplicación y estado de la Maleza       | Dosis (l/ha)  |
| Aplicación temprana: Malezas 1-4 hojas            | 0,7 -1,2 L/ha |
| Aplicación normal: Malezas de 4 hojas a 1 macolla | 1,2 -1,4 l/ha |
| Aplicación tardía: Malezas de más de 1 macolla    | 1,5 l/ha      |

Dependiendo del estado de la maleza puede realizar dos aplicaciones en post-emergencia a la maleza; la primera de 10-12 días después del trasplante) y la segunda de 29-30 días después del trasplante (tardía)



CLIBUT 20 EC (Nº Reg. 6749 de 12 de Agosto de 2024)  
HERBICIDA  
CIHALOFOP BUTIL

\* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

\* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

\*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

\*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

\*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

\*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

## PRESENTACIÓN

Botella de 1 Litro  
Bidoncito de 5 L  
Bidón de 20 L  
Tambor de 200 L